

**Карточка-памятка для пациентов, принимающих
ЛП АПИКСАБАН, таблетки, покрытые пленочной оболочкой,
2,5 мг, 5 мг**

**Храните эту памятку при себе и показывайте ее любому
специалисту системы здравоохранения, участвующему в
Вашем лечении**

**Внимательно прочитайте листок-вкладыш, который находится в упаковке с
лекарственным препаратом.**

Он также размещен на сайте <https://grls.rosminzdrav.ru/Default.aspx>.

- **Регулярно принимайте** лекарственный препарат (ЛП) АПИКСАБАН, в соответствии с листком-вкладышем и назначением лечащего врача.
В случае пропуска приема примите лекарственный препарат как можно скорее, а в дальнейшем продолжите прием 2 раза в сутки в соответствии с исходной схемой, в назначенной дозировке. Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.
 - После начала терапии **не изменяйте и не прекращайте** схему лечения без консультации с лечащим врачом.
 - ЛП АПИКСАБАН является антикоагулянтом - лекарственным препаратом, воздействие которого на организм снижает свертываемость крови и предотвращает образование кровяных сгустков (тромбов). Однако это может увеличить риск кровотечения.
 - Признаки и симптомы кровотечения включают синяки или кровотечения под кожей, стул цвета смолы, кровь в моче, кровотечение из носа, головокружение, усталость, бледность или слабость, внезапную сильную головную боль, кашель с кровью или рвоту с кровью.
 - Если кровотечение не останавливается само по себе, **немедленно обратитесь за медицинской помощью!**
 - Если вы приняли слишком большое количество ЛП АПИКСАБАН, немедленно сообщите своему врачу или иному специалисту системы здравоохранения.
 - Если вам предстоит операция, биопсия или стоматологическое лечение, какая-либо инвазивная процедура, **сообщите своему врачу/медицинскому работнику, что Вы принимаете ЛП АПИКСАБАН.** Возможно, Вам придется прекратить прием ЛП АПИКСАБАН или сделать перерыв.
 - Некоторые лекарственные препараты и пищевые добавки могут повлиять на антикоагулянтный эффект ЛП АПИКСАБАН и увеличивать риск кровотечения или снизить эффективность препарата. Вы можете найти полный список лекарственных препаратов, которые могут повлиять на действие ЛП АПИКСАБАН в листке-вкладыше в упаковке с ЛП.
- Сообщите лечащему врачу/специалисту системы здравоохранения о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать**

какие-либо другие лекарственные препараты.

В случае, если у Вас на фоне приема ЛП возникнет нежелательная реакция, незамедлительно сообщите на эл. адреса:

hot_line@promomed.pro

adversereaction@drugsafety.ru

Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности лекарственного препарата.