

**Информация по безопасности лекарственного препарата (ЛП) Упадацитиниб  
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой,  
30 мг, для пациентов**

- Эта брошюра содержит важную информацию по безопасности, которую Вам следует знать до и во время лечения препаратом ЛП Упадацитиниб таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой, 30 мг
- Для получения дополнительной информации ознакомьтесь, пожалуйста, с листком-вкладышем ЛП Упадацитиниб, таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой, 30 мг, который находится в пачке с ЛП.

**ФИО пациента** \_\_\_\_\_

**ФИО врача, назначившего ЛП Упадацитиниб:** \_\_\_\_\_

**Номер телефона врача:** \_\_\_\_\_

**Дата начала приема ЛП Упадацитиниб:** \_\_\_\_\_

Показывайте эту брошюру любому специалисту здравоохранения, оказывающему Вам медицинскую помощь, например, стоматологу или врачу скорой и неотложной помощи.

Свяжитесь со своим врачом, чтобы сообщить о любых нежелательных реакциях, возникших на фоне применения ЛП Упадацитиниб.

**О любых предполагаемых нежелательных реакциях также можно сообщить в ООО «ПРОМОМЕД РУС»:**

**Российская Федерация, 129090, г. Москва, проспект Мира, дом 13, строение 1, офис 13.**

**Тел.: 8 (800) 222-95-63; 8-800-777-86-04 (круглосуточно)**

**Электронная почта: [hot\\_line@promomed.pro](mailto:hot_line@promomed.pro)**

### **Риск возникновения инфекций**

ЛП Упадацитиниб может ухудшить течение уже имеющейся инфекции или увеличить вероятность возникновения новой инфекции, например, туберкулеза, опоясывающего герпеса или вирусного гепатита.

Немедленно сообщите своему врачу, если Вы заметили признаки инфекции, такие как:

- лихорадка, потливость, озноб, потеря веса или кашель, который не исчезает — это могут быть признаки туберкулеза;
- болезненная кожная сыпь с волдырями — это может быть признак опоясывающего герпеса;
- чувство усталости или одышка — это могут быть симптомы пневмонии.

*Сообщите своему врачу, если:*

- Вам недавно диагностировали туберкулез или Вы когда-либо болели туберкулезом;
- Вы недавно находились в тесном контакте с человеком, больным туберкулезом.

### **Вакцины, используемые для профилактики инфекций**

Живые вакцины (например, вакцина против гриппа в форме назального спрея, против ветряной оспы, кори/эпидемического паротита/краснухи) не следует применять во время лечения ЛП Упадацитиниб или непосредственно перед началом приема данного ЛП.

Прежде чем вакцинироваться, проконсультируйтесь со своим врачом — ему должно быть известно, какие вакцины Вам не следует применять до или во время лечения ЛП Упадацитиниб.

### **Контрацепция, беременность и кормление грудью**

ЛП Упадацитиниб, таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой, 30 мг, нельзя принимать во время беременности.

- Используйте эффективные методы контрацепции во время лечения ЛП Упадацитиниб и в течение 4 недель после приема последней дозы. Проконсультируйтесь со своим врачом касательно эффективных методов контрацепции.

- Если Вы планируете беременность или забеременели, немедленно сообщите об этом своему врачу.

- Не кормите грудью в период лечения ЛП Упадацитиниб, таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой, 30 мг.

### **Риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы**

Прием ЛП Упадацитиниб, таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой, 30 мг, может привести к увеличению уровня холестерина в крови. Ваш врач будет проверять уровень содержания холестерина, пока Вы принимаете ЛП Упадацитиниб.

Немедленно сообщите своему врачу, если Вы заметили такие признаки, как боль или стеснение в груди, так как это может быть симптомом заболеваний со стороны сердечно-сосудистой системы.

### **Риск образования тромбов в венах или легких**

При приеме ЛП Упадацитиниб, таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой, 30 мг, наблюдались случаи образования тромбов в венах или легких.

Немедленно сообщите своему врачу, если Вы заметили признаки образования тромбов в венах или легких, такие как болезненная отечность ног, одышка или боль в груди.

**Риск развития рака**

ЛП Упадацитиниб, таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой, 30 мг, потенциально может увеличить риск развития рака, особенно рака кожи.

Сообщите своему врачу, если Вы заметите какие-либо изменения внешнего вида участка кожных покровов или рост новообразования на Вашей коже.

**Риск нарушения целостности стенок желудочно-кишечного тракта**

ЛП Упадацитиниб, таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой, 30 мг, может увеличить риск нарушения целостности стенок желудочно-кишечного тракта.

Незамедлительно свяжитесь со своим врачом, если у Вас возникла внезапная или необъяснимая боль в животе, а также лихорадка, кровь в стуле, изменения характера и частоты стула.