

**Информация для пациента,  
принимающего лекарственный препарат (ЛП)  
Тофацитиниб, таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые  
пленочной оболочкой, 11 мг**

**Перед применением ЛП Тофацитиниб, таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой, 11 мг, пожалуйста, ознакомьтесь с листком-вкладышем, находящимся в пачке с ЛП, либо на сайте Государственного реестра лекарственных средств для получения дополнительной информации.**

**Если у Вас остались какие-либо вопросы, проконсультируйтесь с врачом или другим медицинским работником.**

- ❖ Лекарственный препарат Тофацитиниб (действующее вещество Тофацитиниб), таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой, 11 мг, является иммунодепрессантом.
- ❖ Всегда принимайте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом.
- ❖ Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу. Примите следующую дозу в обычное время и продолжайте прием препарата как обычно.
- ❖ Расскажите своему лечащему врачу обо ВСЕХ лекарственных препаратах, которые Вы принимаете.

Сообщайте врачу **обо всех нежелательных реакциях**, возникающих на фоне приема лекарственного препарата Тофацитиниб, таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой, 11 мг.

**Немедленно сообщите врачу, если у Вас возникнут какие-либо из следующих признаков и симптомов при приеме лекарственного препарата:**

- Повышение температуры тела, озноб, потливость, усталость, длительный кашель, одышка, появление мокроты или изменение количества, или цвета мокроты, боль в мышцах, теплая на ощупь кожа или покраснение, или болезненность кожи, или появление волдырей на теле, потеря веса, трудности или боль при глотании, диарея или боль в желудке, болезненное или учащенное мочеиспускание могут быть **признаками серьезных инфекций (включая сепсис, оппортунистические инфекции)**;
- Любое увеличение лимфатических узлов на шее, подмышках или в паху; постоянное чувство усталости; лихорадка; ночная потливость; постоянный или усиливающийся кашель; затрудненное дыхание; охриплость или свистящее дыхание; необъяснимая потеря веса (**признаки туберкулеза**);
- Повышение температуры тела, боль в желудке или животе, кровь в стуле, изменения частоты и характера стула неизвестной этиологии могут быть **признаками перфорации желудочно-кишечного тракта**;
- Затрудненное дыхание или глотание, головокружение, отек лица, губ, языка и/или горла, сильный зуд кожи, появление сыпи или волдырей могут быть **признаками аллергической реакции (гиперчувствительности)**;
- Внезапная одышка или затрудненное дыхание, боль в груди или боль в верхней части спины, отек ноги или руки, боль в ноге или болезненность при надавливании, покраснение или изменение цвета ноги или руки, резкое изменение зрения, могут быть **признаками венозной тромбоэмболии**;
- Сильная боль в груди или ощущение стеснения в груди (которые могут

распространяться на руки, челюсть, шею и спину), одышка, холодный пот, головокружение или внезапная слабость могут быть **признаками инфаркта миокарда**;

- Любое новообразование на коже или любые изменения в существующих родинках или пятнах;
- Симптомы заболевания легких, такие как одышка;
- Пожелтение кожи, тошнота и рвота (**признаки поражения печени**).

**Также сообщите врачу:**

- Если Вы болеете в настоящее время или болели в прошлом **туберкулезом**, или Вы вступали в тесный контакт с больными туберкулезом.
- Если Вам недавно сделали **прививку** или она запланирована на ближайшее время;
- Если Вы **беременны или кормите грудью**, думаете, что забеременели, или планируете беременность. Прием ЛП Тофацитиниб, таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой, 11 мг, противопоказан в период беременности. Женщинам детородного возраста следует использовать эффективные методы контрацепции во время лечения ЛП Тофацитиниб, таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой, 11 мг, и в течение как минимум 4 недель после приема последней дозы препарата.

**Контактная информация (пожалуйста, заполните):**

**ФИО пациента:** \_\_\_\_\_

**ФИО врача:** \_\_\_\_\_

**Телефон врача:** \_\_\_\_\_

**В случае возникновения нежелательной реакции Вы можете обратиться в компанию ООО «ПРОМОМЕД РУС» по эл. адресу: hot\_line@promomed.pro**

**Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности лекарственного препарата.**

**После прекращения лечения ЛП Тофацитиниб, таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой, 11 мг, Вы должны хранить эту памятку при себе в течение как минимум 2-х месяцев после приема последней дозы.**

**Дата прекращения приема препарата:** \_\_\_\_\_