

Карточка пациента

Всегда носите эту памятку с собой. Предъявляйте эту памятку каждому врачу и любому другому медицинскому работнику, который оказывает Вам медицинскую помощь, до начала лечения.

Ривароксабан

(поставить галочку рядом с назначенной дозой)

2,5 мг 10 мг 15 мг 20 мг

Я получаю антикоагулянтную терапию препаратом Ривароксабан.

Имя, Фамилия:

Адрес:

Дата рождения:

Масса тела:

Другие препараты/заболевания:

При возникновении неотложной ситуации, пожалуйста, сообщите:

ФИО врача:

Телефон врача:

Данная памятка содержит важную информацию о безопасности, о которой Вам необходимо знать, прежде чем Вы начнете принимать лекарственный препарат (ЛП) Ривароксабан, таблетки, покрытые плёночной оболочкой, 2,5 мг; 10 мг; 15 мг; 20 мг, и во время лечения.

Прочтите данную памятку вместе с листком-вкладышем, расположенном в пачке с лекарственным препаратом.

Если Вы не уверены в понимании прочитанной информации, попросите вашего лечащего врача объяснить ее Вам.

Храните эту памятку при себе и показывайте ее любому специалисту системы здравоохранения, участвующему в вашем лечении.

Информация о лекарственном препарате Ривароксабан, таблетки, покрытые плёночной оболочкой, 2,5 мг; 10 мг; 15 мг; 20 мг

- Препарат Ривароксабан содержит действующее вещество – ривароксабан, который относится к антитромботическим средствам (антикоагулянтам), т. е. к препаратам, которые блокируют образование тромбов.
- Принимайте препарат Ривароксабан регулярно на протяжении периода, указанного лечащим врачом.
- Не прекращайте прием препарата Ривароксабан без консультации с лечащим врачом.
- Сообщите лечащему врачу о том, что Вы принимаете другие антикоагулянты, например, нефракционированный гепарин, эноксапарин, далтепарин, фондапаринукс, варфарин, дабигатрана этексилат, аписабан и другие, кроме случаев перехода с или на ривароксабан или применения нефракционированного

гепарина в дозах, необходимых для обеспечения функционирования центрального венозного или артериального катетера.

- Перед любыми хирургическими вмешательствами или инвазивными процедурами информируйте медицинский персонал о том, что вы принимаете Ривароксабан.

Когда следует обратиться за медицинской помощью?

Прекратите прием препарата и немедленно обратитесь за медицинской помощью при появлении любого из следующих симптомов, которые могут быть очень опасными:

- Выраженное кровотечение;
- Слабость, частый пульс, одышка, снижение артериального давления, беспокойство, холодный пот (могут быть признаками угрожающей жизни аллергической (анафилактической) реакции);
- Слабость, выраженное снижение артериального давления, частый пульс, бледность, одышка, головокружение, обморок, низкий уровень гемоглобина (анемия), черный кал, красная моча (могут быть признаками скрытого кровотечения);
- Головная боль, слабость мышц на одной стороне тела, рвота, судороги, нарушение сознания и напряжение мышц затылка (могут быть признаками внутричерепного или внутримозгового кровоизлияния);
- Кровоизлияние в глаз, кровохарканье, кровь в кале или моче;
- Обширные синяки, подкожные кровоизлияния (гематомы), припухлость тканей или суставов, боль (могут быть следствием кровоизлияния);
- Боль в сердце, низкий объем мочи (могут быть следствием кровотечения);

Сообщайте своему лечащему врачу о возникновении любых нежелательных реакций (даже не описанных в листке-вкладыше).

В случае возникновения нежелательной реакции Вы также можете сообщить об этом по адресу:

hot_line@promomed.pro

Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности лекарственного препарата.