

**Аксартобан, капсулы, 75 мг, 110 мг, 150 мг (МНН: дабигатрана этексилат)
Памятка для пациента по профилактике развития кровотечений
ООО «ПРОМОМЕД РУС»**

Данная памятка содержит важную информацию о безопасности, о которой Вам необходимо знать, прежде чем Вы начнете принимать лекарственный препарат (ЛП) Аксартобан, капсулы 75 мг, 110 мг, 150 мг, и во время лечения. Если Вы не уверены в понимании этой информации, попросите вашего лечащего врача объяснить ее Вам.

Храните эту памятку при себе и показывайте ее любому специалисту системы здравоохранения, участвующему в вашем лечении.

Информация о лекарственном препарате Аксартобан, капсулы 75 мг, 110 мг, 150 мг

- ❖ ЛП Аксартобан, капсулы 75 мг, 110 мг, 150 мг, предотвращает образование опасных тромбов.
- ❖ Следует принимать данный лекарственный препарат только в соответствии с указаниями лечащего врача. Не следует пропускать дозу или прекращать прием лекарственного препарата, не проконсультировавшись с лечащим врачом.
- ❖ Расскажите своему лечащему врачу обо ВСЕХ лекарственных препаратах, которые Вы принимаете, включая ЛП, отпускаемые по рецепту и без рецепта, витамины и биологически активные добавки.
- ❖ Если Вы забыли принять лекарственный препарат, просто примите следующую запланированную дозу в обычное время. Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенный прием препарата.
- ❖ Следует избегать одновременного применения ЛП Аксартобан, капсулы 75 мг, 110 мг, 150 мг, с антидепрессантами из группы СИОЗС (флуоксетин, флувоксамин и др.) и СИОЗСН (венлафаксин, милнаципран), в связи с повышением риска кровотечений.
- ❖ В случае, если Вы принимаете нестероидные противовоспалительные лекарственные препараты (например, ЛП МНН анальгин, ЛП МНН ибупрофен, ЛП МНН диклофенак), проконсультируйтесь с лечащим врачом, так как они могут значительно повысить у Вас риск кровотечения.
- ❖ Обратите внимание на следующие факторы риска, повышающие риск кровотечения: возраст старше 75 лет, значительные кровотечения в прошлом, нарушение функции почек, нарушение функции печени, эзофагит или гастрит, прием препаратов, влияющих на свертываемость крови (аспирин или другие антикоагулянты).
- ❖ Если Вам предстоит хирургическая операция или инвазивное вмешательство, необходимо сообщить врачу (в том числе и стоматологу) о том, что Вы принимаете ЛП Аксартобан, капсулы 75 мг, 110 мг, 150 мг, до проведения процедуры.
- ❖ Дополнительную информацию смотрите в листке-вкладыше лекарственного препарата Аксартобан, капсулы 75 мг, 110 мг, 150 мг, в упаковке или на сайте <https://grls.rosminzdrav.ru/GRLS.aspx>;

Вам необходимо незамедлительно обратиться к врачу в случае развития следующих симптомов:

- Если у Вас появился какой-либо из следующих признаков или симптомов, свидетельствующих о кровотечении: отек, неприятные ощущения, необъяснимые боли или головные боли, головокружение, бледность, слабость, необычные гематомы, носовые кровотечения, кровотечения из десен, длительные и необычные кровотечения из порезов на коже, необычные менструальные кровотечения или

вагинальные кровотечения, кровь в моче (может быть красного или коричневого цвета), красный или черный стул, кашель с кровью, кровавая рвота или рвота в виде кофейной гущи.

- Если Вы упали или поранились в период, когда Вы получаете лекарственный препарат (в особенности, если вы ударились головой), следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

В случае возникновения нежелательной реакции, незамедлительно сообщить по адресу:

hot_line@promomed.pro

adversereaction@drugsafety.ru

Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности лекарственного препарата.