

Листок-вкладыш – информация для пациента

Энтрилак-Про, порошок для приготовления раствора для приема внутрь

Действующие вещества компонента А:

макрогол + натрия сульфат + натрия хлорид + калия хлорид

Действующие вещества компонента Б:

аскорбиновая кислота + натрия аскорбат

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Данный лекарственный препарат является препаратом, отпускаемым без рецепта.
- Всегда принимайте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Энтрилак-Про, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед приемом препарата Энтрилак-Про.
3. Прием препарата Энтрилак-Про.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Энтрилак-Про.
6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения.

1. Что из себя представляет препарат Энтрилак-Про, и для чего его применяют

Препарат Энтрилак-Про содержит действующие вещества: макрогол + натрия сульфат + натрия хлорид + калия хлорид (в пакетике А) и аскорбиновая кислота + натрия аскорбат (в пакетике Б), которые относятся к группе слабительных средств. Пероральный прием раствора электролитов, основанного на макроголе, увеличивает перистальтику, вызывая умеренную диарею, результатом которой становится быстрое опорожнение содержимого кишечника. Натрия сульфат и аскорбиновая кислота оказывают осмотическое действие, вызывающее слабительный эффект. Макрогол увеличивает объем каловых масс, что ведет к усилению перистальтики кишечника. Электролиты, входящие в состав препарата, совместно с дополнительным приемом жидкости препятствуют нарушению водно-электролитного баланса.

Показания к применению

Препарат Энтрилак-Про применяется у взрослых в возрасте от 18 лет для подготовки к диагностическим исследованиям (например, эндоскопическому, рентгенологическому и другим исследованиям кишечника) и оперативным вмешательствам, требующим опорожнения кишечника.

Если слабительный эффект не достигнут, или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Энтрилакс-Про

Противопоказания

Не принимайте препарат Энтрилакс-Про, если:

- у Вас аллергия на макрогол, натрия сульфат, натрия хлорид, калия хлорид, аскорбиновую кислоту, натрия аскорбат или любые другие компоненты препарата, перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша;
- у Вас нарушение опорожнения желудка (гастропарез);
- у Вас кишечная непроходимость;
- у Вас образование сквозного отверстия (перфорация) в стенке органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) или риск перфорации;
- у Вас наследственное заболевание, связанное с нарушением метаболизма аминокислот, главным образом фенилаланина (фенилкетонурия) (из-за содержания в составе аспартама);
- у Вас дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (из-за содержания в составе аскорбиновой кислоты);
- у Вас воспалительные заболевания тонкого и толстого кишечника (в том числе язвенный колит, болезнь Крона) или патологическое расширение толстой кишки (мегаколон);
- у Вас бессознательное состояние.

Особые указания и меры предосторожности

Перед приемом препарата Энтрилакс-Про проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки. Особенно важно сообщить, если:

- у Вас склонность к забрасыванию пищи в дыхательные пути (аспирации) или к пассивному забросу пищи из желудка или пищевода в ротовую полость;
- у Вас проблемы с глотанием;
- у Вас нарушения сознания;
- у Вас обезвоживание (признаки которого могут включать сухость во рту, чувство жажды, головную боль, головокружение, мочеиспускание реже обычного, сильную усталость, учащенное сердцебиение и спутанность сознания);
- у Вас тяжелая сердечная недостаточность;
- у Вас тяжелая почечная недостаточность (клиренс креатинина (КК) < 30 мл/мин);
- у Вас острые воспалительные заболевания кишечника тяжелой степени;
- у Вас боль в животе;
- у Вас сердечная недостаточность или заболевания сердца, включая высокое кровяное давление, нерегулярное или учащенное сердцебиение;
- у Вас заболевания щитовидной железы.

Препарат будет вводиться Вам под медицинским контролем, если Вы пожилого возраста, ослаблены или истощены, если Вы склонны к забрасыванию пищи в дыхательные пути

(аспирации) или к пассивному забросу пищи из желудка или пищевода в ротовую полость, если у Вас нарушено сознание или если препарат Вам вводят через назогастральный зонд.

Если Вы ослаблены или имеете серьезные заболевания почек или сердца, или если Вы подвержены риску изменения уровня солей в организме (электролитные нарушения), лечащий врач может принять решение о проведении специального мониторинга до и после процедуры.

Если при применении препарата у Вас возникли отеки, одышка, повышенная утомляемость, сердечная недостаточность, немедленно обратитесь к лечащему врачу.

Если при применении препарата у Вас возникли такие симптомы, как выраженный метеоризм, вздутие живота, боль в животе или любые другие реакции, затрудняющие дальнейший прием препарата, прекратите прием препарата и немедленно обратитесь к лечащему врачу.

Если при применении препарата у Вас возникли такие симптомы, как внезапная боль в животе, ректальное кровотечение, тошнота, рвота, слабость, повышение температуры тела, немедленно обратитесь к лечащему врачу.

Вы должны точно следовать инструкции по применению препарата Энтрилак-Про и пить столько воды или прозрачной жидкости, сколько Вам необходимо, чтобы избежать обезвоживания.

Дети и подростки

Не давайте препарат Энтрилак-Про детям в возрасте от 0 до 18 лет, поскольку эффективность и безопасность в данной возрастной группе не установлены.

Другие препараты и препарат Энтрилак-Про

Сообщите лечащему врачу о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Диарея, вызванная приемом препарата Энтрилак-Про, может привести к значительному нарушению всасывания других одновременно принимаемых препаратов.

Если Вы принимаете другие препараты перорально (например, препараты для предупреждения беременности (пероральные контрацептивы)), Вам не следует принимать их за час до, во время и через час после приема препарата Энтрилак-Про, поскольку они могут быть выведены из ЖКТ, не всосавшись.

Препарат Энтрилак-Про может взаимодействовать с пищевыми загустителями на основе крахмала. Макрогол снижает загущающий эффект крахмала и разжижает препараты, которые должны оставаться густыми для пациентов с проблемами глотания.

Препарат Энтрилак-Про с пищей

Не следует употреблять твердую пищу с начала приема раствора препарата Энтрилак-Про и до окончания диагностического исследования или оперативного вмешательства.

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, предполагаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Беременность

Препарат Энтрилак-Про следует принимать только в случаях, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

Грудное вскармливание

Препарат Энтрилакс-Про следует принимать только в случаях, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для ребенка.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат Энтрилакс-Про не оказывает или оказывает незначительное влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами. В период проведения курса подготовки к медицинским манипуляциям препаратом Энтрилакс-Про рекомендуется воздержаться от управления транспортными средствами и работы с механизмами (см. раздел «Возможные нежелательные реакции»).

Препарат Энтрилакс-Про содержит калий

Данный лекарственный препарат содержит 28,4 ммоль/л (1,1 г) калия на курс подготовки кишечника (курс подготовки кишечника представляет собой два литра раствора препарата Энтрилакс-Про). Необходимо учитывать пациентам со сниженной функцией почек и пациентам, находящимся на диете с ограничением поступления калия.

Препарат Энтрилакс-Про содержит аспартам

Данный лекарственный препарат содержит 0,233 г аспартама на курс подготовки кишечника (курс подготовки кишечника представляет собой два литра раствора препарата Энтрилакс-Про). Аспартам является источником фенилаланина. Он может быть вреден, если у Вас фенилкетонурия – редкое генетическое нарушение, при котором накапливается фенилаланин из-за неспособности организма правильно выводить его.

3. Прием препарата Энтрилакс-Про

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза:

Рекомендуемая доза составляет два литра раствора (см. подраздел «Путь и (или) способ введения»).

Перед проведением диагностического исследования (например, эндоскопического, рентгенологического и другого исследования кишечника) и оперативного вмешательства необходимо пройти важный процесс подготовки кишечника, который включает в себя 3 этапа:

1. Соблюдение специального рациона питания.
 2. Выбор схемы приема препарата в зависимости от времени проведения исследования или операции.
 3. Проведение процесса очистки кишечника с помощью препарата Энтрилакс-Про.
- Детальная информация по каждому этапу приведена ниже.

1. Соблюдение специального рациона питания

За 3 дня до проведения исследования или операции важно соблюдать специальный рацион питания.

Разрешено:

Вся белковая пища:

- отварное мясо и птица

Запрещено:

Вся растительная пища:

- овощи,

(кроме колбасных изделий),
 - нежирные сорта рыбы,
 - нежирные кисломолочные
 продукты,
 - яйца.

Желе, сахар, мед.

Жидкости:

- прозрачные бульоны,
 - чай без молока,
 - кофе без молока,
 - компоты без ягод,
 - сок без мякоти,
 - безалкогольные неокрашенные напитки,
 - вода.

- фрукты,
 - ягоды,
 - зелень,
 - крупы,
 - орехи,
 - каши,
 - хлеб.

Жидкости:

- окрашенные соки,
 - алкоголь,
 - газированные напитки.

Все продукты, не входящие
 в список разрешенных.

2. Выбор схемы приема препарата Энтрилак-Про в зависимости от времени проведения исследования или операции

Перед оперативными вмешательствами используют одноэтапную вечернюю схему приема препарата Энтрилак-Про.

Перед проведением диагностического исследования необходимо выбрать с лечащим врачом наиболее подходящую схему приема препарата Энтрилак-Про в зависимости от времени проведения процедуры и Вашей повседневной активности.

Время исследования	Схема приема препарата
08:00 – 10:00 <u>Рацион питания за 3 дня до проведения исследования:</u> согласно списку разрешенных продуктов и жидкостей. <u>Рацион питания за 2 дня до проведения исследования:</u> согласно списку разрешенных продуктов и жидкостей. <u>Рацион питания накануне дня исследования:</u> <i>завтрак:</i> согласно списку разрешенных продуктов и жидкостей; <i>обед и ужин:</i> только разрешенные прозрачные жидкости.	Одноэтапная вечерняя схема* <u>День накануне исследования:</u> 19:00 – 20:00 принять первый литр раствора препарата; 21:00 – 22:00 принять второй литр раствора препарата. После каждого принятого литра препарата необходимо выпить 500 мл разрешенной жидкости.
10:00 – 14:00 <u>Рацион питания за 3 дня до проведения исследования:</u> согласно списку разрешенных продуктов и жидкостей. <u>Рацион питания за 2 дня до проведения</u>	Двухэтапная схема* <u>День накануне исследования:</u> 20:00 – 21:00 принять первый литр раствора препарата. <u>День исследования:</u> 06:00 – 07:00 принять второй литр

Время исследования	Схема приема препарата
<u>исследования:</u> согласно списку разрешенных продуктов и жидкостей. <u>Рацион питания накануне дня</u> <u>исследования:</u> <i>завтрак и легкий обед до 13:00:</i> согласно списку разрешенных продуктов и жидкостей; <i>ужин:</i> только разрешенные прозрачные жидкости.	раствора препарата. После каждого принятого литра препарата необходимо выпить 500 мл разрешенной жидкости.
14:00 – 19:00 <u>Рацион питания за 3 дня до проведения</u> <u>исследования:</u> согласно списку разрешенных продуктов и жидкостей. <u>Рацион питания за 2 дня до проведения</u> <u>исследования:</u> согласно списку разрешенных продуктов и жидкостей. <u>Рацион питания накануне дня</u> <u>исследования:</u> <i>завтрак, обед и легкий ужин до 18:00:</i> согласно списку разрешенных продуктов и жидкостей. <u>В день исследования с утра:</u> только разрешенные прозрачные жидкости.	Одноэтапная утренняя схема* <u>День исследования:</u> 08:00 – 09:00 принять первый литр раствора препарата; 10:00 – 11:00 принять второй литр раствора препарата. После каждого принятого литра препарата необходимо выпить 500 мл разрешенной жидкости.

* При необходимости время приема препарата Энтрилак-Про может корректироваться в зависимости от Вашей повседневной активности и времени на дорогу до клиники с соблюдением указанных временных интервалов.

3. Проведение процесса очистки кишечника с помощью препарата Энтрилак-Про

Упаковка препарата Энтрилак-Про содержит два пакетика (саше или стика) А и два пакетика (саше или стика) Б, из которых готовят раствор для приема внутрь. Вне зависимости от веса пациента общая доза препарата Энтрилак-Про для качественной очистки кишечника составляет 2 литра раствора препарата.

В случае проведения процедур под общей анестезией:

При двухэтапной, одноэтапной утренней и одноэтапной вечерней схемах дозирования прием препарата Энтрилак-Про и других жидкостей (согласно списку разрешенных – см. выше) необходимо прекратить не менее чем за 2 часа, но не более чем за 4 часа до начала процедуры.

В случае проведения процедур без анестезии:

При двухэтапной схеме дозирования прием препарата Энтрилак-Про и других жидкостей (согласно списку разрешенных – см. выше) необходимо прекратить не менее чем за 1 час, но не более чем за 4 часа до начала процедуры.

При одноэтапной утренней и одноэтапной вечерней схемах дозирования прием препарата Энтрилак-Про необходимо прекратить не менее чем за 2 часа, но не более чем за 4 часа до

начала процедуры, а прием других жидкостей (согласно списку разрешенных – см. выше) необходимо прекратить не менее чем за 1 час, но не более чем за 4 часа до начала процедуры.

Критерием готовности к диагностическому исследованию или оперативному вмешательству является появление жидкого прозрачного или почти прозрачного, слегка окрашенного стула.

При приеме раствора препарата Энтрилакс-Про дома необходимо учитывать соответствующий временной интервал поездки в клинику для проведения процедуры. Частый жидкий стул появляется обычно в течение 1 часа с момента начала приема каждого литра раствора препарата Энтрилакс-Про и заканчивается, как правило, через 1–2 часа. В период приема препарата частота дефекаций может увеличиться до 12–15 раз.

Пациенты с нарушениями функции почек

Если у Вас тяжелая почечная недостаточность ($\text{КК} < 30$ мл/мин), необходимо соблюдать осторожность при приеме данного препарата.

Пациентам с нарушением функции почек или пациентам, которые соблюдают диету с контролируемым содержанием калия, следует учитывать, что препарат содержит 14,2 ммоль калия на 1 литр раствора.

Путь и (или) способ введения

Препарат предназначен для приема внутрь.

1) Приготовление первого литра раствора препарата Энтрилакс-Про:

Необходимо содержимое одного пакетика (саше или стика) А и одного пакетика (саше или стика) Б полностью растворить в небольшом количестве питьевой негазированной воды комнатной температуры, довести объем раствора водой до 1 литра и перемешать.



2) Приготовление второго литра раствора препарата Энтрилакс-Про:

Повторить алгоритм приготовления раствора препарата из пункта 1 (см. выше), используя оставшиеся пакетик (саше или стик) А и пакетик (саше или стик) Б.

Приготовленный раствор препарата Энтрилакс-Про следует выпить в течение 1–2 часов, например, по 1 стакану каждые 15–30 минут.

ВАЖНО: во время приема препарата Энтрилакс-Про настоятельно рекомендуется дополнительно употребить 1 литр другой жидкости: негазированная вода, бульон (прозрачный, процеженный), фруктовый сок без мякоти, безалкогольные напитки, чай без молока (можно с сахаром или медом).

Если Вы применили препарата Энтрилакс-Про больше, чем следовало

Если Вы считаете, что приняли препарата больше, чем следовало, или не разбавили препарат в соответствии с инструкцией, или не выпили дополнительный объем воды или прозрачной жидкости, немедленно сообщите об этом врачу и выпейте достаточное количество воды или

прозрачной жидкости, чтобы избежать обезвоживания. В таком случае у Вас могут появиться такие симптомы, как тяжелая диарея и электролитные нарушения (изменения уровня солей в организме).

При наличии вопросов по приему препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат Энтрилакс-Про может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Прекратите прием препарата Энтрилакс-Про и немедленно обратитесь за медицинской помощью в случае возникновения одного из следующих признаков серьезных нежелательных реакций:

Частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно):

- затруднение дыхания, ощущение нехватки воздуха, чувство давления в груди, сыпь на коже, кожный зуд, отек губ, языка, лица, резкая слабость (анафилактические реакции);
- отек лица, шеи и гортани, затруднение дыхания и глотания (ангионевротический отек).

Другие возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при приеме препарата Энтрилакс-Про.

Очень часто (могут возникать более чем у 1 человека из 10):

- боль в животе, тошнота, вздутие живота, раздражение в области ануса;
- недомогание, повышение температуры тела.

Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10):

- нарушения сна;
- головокружение;
- головная боль;
- рвота;
- нарушение пищеварения в пищеводе и желудке (диспепсия);
- озноб;
- жажда;
- голод.

Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

- затрудненное глотание;
- отклонения от нормы функциональных печеночных проб;
- дискомфорт.

Частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно):

- нарушение дыхания (диспноэ);
- обезвоживание (дегидратация), электролитные нарушения, включая снижение уровня бикарбоната в крови, повышение уровня кальция в крови (гиперкальциемию) и снижение уровня кальция в крови (гипокальциемию), снижение уровня фосфатов в крови (гипофосфатемию), снижение уровня калия в крови (гипокалиемию) и снижение уровня натрия в крови (гипонатриемию) и изменения уровней хлоридов в крови;
- судороги, связанные с тяжелой гипонатриемией (снижением уровня натрия в крови);
- кратковременное повышение артериального давления;

- нарушение ритма сердца (аритмия), учащенное сердцебиение;
- вздутие живота (метеоризм), позывы на рвоту;
- крапивница, зуд, сыпь, покраснение кожи (аллергические кожные реакции).

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. К ним также относятся любые нежелательные реакции, не указанные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения

Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1

Телефон: +7 800 550 99 03

Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru или npr@roszdravnadzor.gov.ru

Сайт: www.roszdravnadzor.gov.ru

Республика Казахстан

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Национальный Центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан

Адрес: 010000, г. Астана, район Байконур, ул. А. Иманова, 13 (БЦ «Нурсаулет 2»)

Телефон: +7 7172 235 135; +7 7172 78 98 90

Электронная почта: farm@dari.kz, pdlc@dari.kz

Сайт: www.ndda.kz

Республика Беларусь

Республиканское унитарное предприятие «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

Адрес: 220037, г. Минск, пер. Товарищеский, 2а

Телефон: +375 17 231 85 14; + 375 17 354 53 53

Электронная почта: rceth@rceth.by

Сайт: www.rceth.by

Республика Армения

«Научный центр экспертизы лекарств и медицинских технологий им. академика Э. Габриеляна»

Адрес: 0051, г. Ереван, пр. Комитаса 49/5

Телефон: +374 60 83 00 73; + 374 10 20 05 05

Электронная почта: info@ampra.am

Сайт: www.pharm.am

Кыргызская Республика

Департамент лекарственных средств и медицинских изделий при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики

Адрес: 720044, г. Бишкек, ул. 3-я линия, 25

Телефон: 0800 800 26 26; + 996 312 21 92 86

Электронная почта: pharm@dlsmi.kg

Сайт: www.dlsmi.kg

5. Хранение препарата Энтрилак-Про

Храните лекарственный препарат в недоступном для детей месте.

Не принимайте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на картонной пачке после «Годен до».

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Хранить при температуре не выше 25 °С. Восстановленный раствор хранить при температуре не выше 8 °С.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препараты, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения

Препарат Энтрилак-Про содержит:

Действующими веществами **компонента А** являются: макрогол + натрия сульфат + натрия хлорид + калия хлорид.

Каждый пакетик (саше или стик) содержит 100 г макрогола-3350, 7,5 г натрия сульфата безводного, 2,691 г натрия хлорида, 1,015 г калия хлорида.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: аспартам, ацесульфам калия, ароматизатор лимонный.

Препарат Энтрилак-Про содержит калий, аспартам (см. раздел 2).

Действующими веществами **компонента Б** являются: аскорбиновая кислота + натрия аскорбат.

Каждый пакетик (саше или стик) содержит 4,7 г аскорбиновой кислоты, 5,9 г натрия аскорбата.

Внешний вид препарата Энтрилак-Про и содержимое упаковки

Порошок для приготовления раствора для приема внутрь.

Компонент А: Порошок от белого до желтого цвета с характерным запахом лимона.

Компонент Б: Порошок от белого до светло-коричневого цвета.

Компонент А: По 111,896 г порошка в пакетики (саше или стики) из пленки бумага/полиэтилен/алюминий/полиэтилен (бумага/ПЭ/АЛ/ПЭ).

Компонент Б: По 10,6 г порошка в пакетики (саше или стики) из пленки бумага/полиэтилен/алюминий/полиэтилен (бумага/ПЭ/АЛ/ПЭ).

По 2 пакетика со смесями А и Б вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Категория отпуска лекарственного препарата

Лекарственный препарат относится к категории отпуска без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения

Российская Федерация

ООО «ПРОМОМЕД РУС»

Адрес: 129090, г. Москва, проспект Мира, дом 13, строение 1, офис 13

Телефон: +7 (495) 640 25 28

Электронная почта: reception@promomed.pro

Производитель

Российская Федерация

АО «Биохимик»

Адрес: 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 15А

За любой информацией о препарате следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения:

Российская Федерация и Республика Армения

ООО «ПРОМОМЕД РУС»

Адрес: Российская Федерация, 129090, г. Москва, проспект Мира, дом 13, строение 1, офис 13

Телефон: 8 800 222 95 63; 8 800 777 86 04 (круглосуточно)

Электронная почта: hot_line@promomed.pro, armenia@drugsafety.ru

Кыргызская Республика

ОсОО «ДАСМЕД»

Адрес: Кыргызская Республика, 720040, г. Бишкек, ул. Токтогула, д. 108

Телефон: 8 800 222 95 63; 8 800 777 86 04 (круглосуточно); + (996) 703 699 466

Электронная почта: hot_line@promomed.pro, pv@dasmed.kg

Республика Беларусь

ООО «МЕДТЕХПРОМ»

Адрес: Республика Беларусь, 220118, г. Минск, ул. Машиностроителей, д. 29, пом. 1

Телефон: 8 800 222 95 63; 8 800 777 86 04 (круглосуточно);

+ (375) 17 336 04 51; + (375) 17 336 04 20

Электронная почта: hot_line@promomed.pro, belarus@drugsafety.ru

Республика Казахстан

ТОО «Decalog» (ДЕКАЛОГ)

Адрес: Республика Казахстан, 050050, г. Алматы, ул. Глазунова, 41А-4

Телефон: 8 800 222 95 63; 8 800 777 86 04 (круглосуточно); +7 (701) 731 52 18

Электронная почта: hot_line@promomed.pro, decalog@list.ru

Прочие источники информации

Листок-вкладыш доступен в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза и на официальном сайте уполномоченного органа (экспертной организации) <https://grls.rosminzdrav.ru> (https://lk.regmed.ru/Register/EAEU_SmPC).